

JİNEKOMASTİ NEDENLERİ

1. Normal puberte
2. Klinefelter
3. Reifenstein sendromu
4. İlaçlar (Östrojen, testesteron, hCG, rezerpin, simetidin, fenotiazin)
5. Hiper ve hipotiroidi
6. Adrenal hiperplazi
7. Ağır malnutrisyon veya kronik hastalıkların nekahatirde: Tbc, DM, siroz, kalp yetmezliği, digital tedavisi, böbrek yetmezliği.
8. Neoplasmalar: Hodgkin, pituiter tm, adrenal kortikal karsinoma, testis tm, bronkojenik karsinoma.

JİNEKOMASTİDE YAKLAŞIM

1. Öykü (büyüme hızı, başlangıç zamanı ve gidig hızı, ilaçlar, ailevi özellik) muayene (boy, em olarak jinekomastrinin belirlenmesi)

2. T₄ ve TSH (hipotiroidi)
LH ve FSH (hipotiroidi, Klinefelter)
PRL * (hipotiroidi, pituiter tm)
hCG (neoplasma)

Östradiol
testesteron
17 ketost.
DHEA-S

} testiküler/adrenal

3. Craniografi ve/veya CAT (pituiter tm)

Akciğer grafisi (neoplasma)

4. Karyotipi (Klinefelter)