

## BRONŞİOLİT (

### Yapılacak Tetkikler

- F.M
  - P.A ve lateral AC grafisi
  - Hemogram, PY, sedimentasyon, CRP
  - Nasofarings sekresyonunda viruslar (RSV, influenza, parainfluenza, adenovirus)
  - Nasofarings kültürü
  - Kan gazları ve pH
  - Nazal smear
  - Gaitada parazit (3 defa)
  - IgG, IgA, IgM, IgE düzeyleri
  - PPD
  - Açlık mide suyuna Tbc açısından spesifik kültürü (3 defa)
- Tekrarlayan wheezing, bronşit bazı tablolarında*

### Tekrarlayan Bronşiolit

(Yukarıdakilere ek olarak)

- Ter testi
- pH metre
- High Resolution toraks BT

### Tedavi

- O<sub>2</sub> (35-40 oranında)
  - Sıvı replasmanı (dehidrate ise)
  - Bronkodilatör nebul (20 dakika arayla 3 defa) (Salbutamol 0.1 mg/kg/doz)
  - Steroid (prednizon 1-2 mg/kg/doz)
  - Teofilin (aminocardol 4 mg/kg/doz)
- teofilin kullanılmıyorsa*

### Ayırıcı tanı

- Asthma
- Kistik fibroz
- Gastroözofajial reflü
- Trakeaözofajial reflü
- Yabancı cisim aspirasyonu
- Bronşiektazi
- Bronkopulmoner displazi
- Hava yoluna dışarıdan baskı (büyük damarların anomalisi, bronkojenik kist, teratom)
- Yapısal yavayolu defektleri (Treakeobronchomalazi, bronşial stenoz)

Nöromuskuler hastalıklar