


YENİDOĞAN SARILIĞININ AYIRICI TANISI



SARILIKLI YENİDOĞANLARDA YAPILMASI GEREKEN TETKİKLER

- Total bilirubin, direkt ve indirekt bilirubin
- Anne ve bebek kan grupları
- Hematokrit ve hemoglobin
- Direkt Combs
- Periferik yayma –eritrosit morfolojisi (ABO=sferositos Rh=normoblastositos)
- Retikülosit

UZAYAN YENİDOĞAN SARILIKLARINDA (3 Haftayı geçen)

- T3, T4, TSH
- Diz grafisi isteyip HİPOTİROİDİYİ mutlaka ekarte et...

Uzamış sarılık nedenleri

- Anne sütü sarılığı
- Hemolitik kan hastalıkları
- Hipotiroidizm
- Pilor stenozu
- Crigler Najjar sendromu
- Cephalhematom

Direkt bilirubin

- TORCH
- Hepatit markerları
- Annede hepatit markerları
- Sepsis kriterleri
- DMH testi
kinaz
- İdrarda redüktan madde
- T3, T4, TSH
- Alfa 1 antitripsin
- Ter testi
- Vertebra grafisi
- Biyokimya ALT, AST, AP, GGT, LDH
- Karaciğer USG
- Sintigrafi
- Biopsi

İndirekt bilirubin

- * Kan grubu
- * Retikülosit
- * Direkt Coombs
- * Hemogram
- * T3, T4, TSH
- * Gerekirse G6PD, pirüvat